

## **Het gebruik van “paracetamol” binnen Kinderopvang ‘t Hummelhuis**

### **Protocol Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking & medische handelingen**

Kinderopvang 't Hummelhuis werkt volgens verschillende protocollen en beleidsplannen. 1 van deze protocollen is het protocol “Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking & medische handelingen”. In dit protocol staat o.a. beschreven dat ouders een “overeenkomst gebruik geneesmiddelen” moeten ondertekenen, zodra een kind gedurende zijn/haar verblijf binnen de kinderopvang medicatie nodig heeft. Dit kan zowel gaan om medicatie voorgeschreven door een huisarts als om de zogenaamde zelfzorgmedicatie. Onder deze zelfzorgmedicatie valt ook “paracetamol” (of eventuele andere koortsverlagende medicijnen).

### **Paracetamol**

Paracetamol lijkt een “onschuldig” medicijn. Paracetamol is een koortsverlagend medicijn. Koorts heeft echter altijd een oorzaak, die helaas niet altijd direct aan te tonen is. Om een goed beeld te krijgen van de toestand van een kind en te kunnen beoordelen of het verantwoord is om het kind op de opvang te houden, is de lichaamstemperatuur een belangrijke graadmeter. Door het gebruik van paracetamol echter bestaat het risico dat symptomen onderdrukt worden, wat tot een foute inschatting van de situatie bij het kind kan leiden. Een kind kan ernstiger ziek zijn, dan op grond van het gedrag van het kind verwacht zou worden, en de mogelijke ernst van een ziekte kan dan onvoldoende snel worden onderkend.

### **Advies van de GGD**

Pedagogisch medewerkers kunnen alleen constateren dat een kind ziek is en niet wat het kind mankeert. Het stellen van een diagnose is altijd voorbehouden aan een arts.

**Op advies van de GGD wordt op de kinderopvang door de pedagogisch medewerkers paracetamol alleen toegediend als pijnstiller en als dit op voorschrift is van een (huis)arts.** Dit dient u dan ook aan ons aan te kunnen tonen!

### **Met paracetamol naar de kinderopvang**

We benadrukken dat het **niet** de bedoeling is dat ouders hun kind paracetamol toe dienen vlak voordat het naar de opvang komt. Na een paar uur, als de paracetamol is uitgewerkt kan de koorts omhoog schieten en kan het gevaar van een koortsstuip ontstaan.

Thuis kunnen ouders hun kind goed monitoren, maar pedagogisch medewerkers hebben te veel kinderen in een groep om de koorts van het kind gedurende de dag nauwlettend in de gaten te houden. De verantwoordelijkheid hiervoor kan en wil Kinderopvang 't Hummelhuis niet nemen. Hoe graag wij het ook zouden willen, wij kunnen dan niet de zorg bieden die uw kind op dat moment nodig heeft.

Mocht een ouder het kind wel paracetamol hebben toegediend voordat het naar de opvang ging, dan verzoeken wij ouders met klem dit te melden bij de aanwezige pedagogisch medewerker(s). Het is ouders ook niet toegestaan om gedurende de dag op het kinderdagverblijf zelf het kind paracetamol te geven om het kind op het kinderdagverblijf te kunnen laten.